

# LIFTING CERVICO-FACIAL


Chirurgie esthétique du vieillissement  
de la face et du cou

Au cours du vieillissement, les différentes structures de la face et du cou s'affaissent :



- Chute des sourcils
- Accentuation des bourrelets de chaque côté du nez et apparition des bajoues
- La peau du cou s'affaisse et un double menton apparaît

Le lifting corrige tout cet affaissement en remplaçant les différentes structures à leur place d'origine et en tendant la peau de façon naturelle. La peau en excès est enlevée. Il y aura donc, dans cette chirurgie, des cicatrices mais l'art est de les placer toutes dans les cheveux.



L'intervention est pratiquée sous anesthésie locale associée à une analgésie générale. L'hospitalisation est de trois jours. Le lendemain il y a beaucoup d'œdème et les ecchymoses commencent à apparaître. Le visage dégonfle en deux à trois jours mais les petits hématomes peuvent persister une quinzaine de jours. Le patient peut reprendre sa vie sociale normale au bout de dix à quinze jours et sa vie professionnelle au bout de trois semaines. Cependant, bien que personne ne s'en aperçoive, le patient va ressentir son visage travailler (picotements et/ou tiraillements). C'est, également, ceci « l'effet lifting » : le chirurgien retend la peau pendant l'intervention mais, en cicatrisant progressivement, cette peau se revitalise et retrouve un aspect plus jeune.

Il s'agit d'une intervention merveilleuse mais qui nécessite une parfaite préparation à l'intervention et une bonne explication des suites opératoires.

## Docteur Patrick Knipper Chirurgie Plastique

### LIFTING

INTERVENTION : 2 à 3 heures

HOSPITALISATION : 24 ou 48 heures

FILS A ENLEVER : au douzième jour

PANSEMENTS : Pendant 6 jours

CICATRICES:



### SOINS POSTOPÉRATOIRES :

Antalgique, si demande.

En postopératoire immédiat, laisser le patient en décubitus dorsal sans pansement, la tête reposant sur un champ stérile. Surveiller régulièrement la survenue d'un hématome facial et/ou cervical. Nettoyer simplement les cicatrices avec du sérum physiologique.

Le lendemain : Lever du patient, douche. Contrôle des redons : Ablation du redon si quantité inférieure à 10 cc,

Le surlendemain : Ablation systématique du redon à J + 2. Douche + shampooing avec l'aide de l'infirmière. Séchage léger à l'aide du sèche-cheveux sur la position froide.

### SORTIE :

- Le jour même ou lendemain si lifting partiel.
- Le surlendemain si lifting complet.
- Consultation de contrôle la semaine suivante.
- Pas d'ablation des fils car ils se résorbent tous seuls.

### CONSEILS AU PATIENT POUR LES SUITES:

- Prévoir un foulard pour la sortie.
- La présence des ecchymoses et des œdèmes au niveau de la face et du cou sont normales pendant quelques jours. Ceux-ci pourront persister une quinzaine de jours.
- Éviter l'exposition solaire sur les ecchymoses.
- Pansement : Après la douche et le shampooing, séchage léger des cheveux à l'aide d'un sèche-cheveux sur la position froide. Ensuite, nettoyer simplement les cicatrices (devant et derrière les oreilles) avec du sérum physiologique et une compresse stérile.
- Appliquer ensuite (pas avant deux semaines) une crème bien hydratante sur l'ensemble du visage et du cou
- L'ensemble de l'inconfort postopératoire est fréquent après un lifting et peut persister pendant trois mois.